



HÄNDE-/HAUT-  
DESINFIZIERUNGSMITTEL

# AHD 2000®

Alkoholisches Hände- und  
Haut-Desinfektionsmittel



# Produktinformation

Bitte sorgfältig lesen!

**AHD 2000®** Gebrauchsfertig

Lösung zur Anwendung auf der Haut

Wirkstoff: Ethanol 96 %

Zul.-Nr.: 6339804.00.00

## ZUSAMMENSETZUNG

100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksamer Bestandteil: 79,9 g Ethanol 96 %; Sonstige Bestandteile: Butan-2-on (Denaturierungsmittel), Macrogolglycerolcocoate, Parfümöl Pinoflor, Milchsäure, Gereinigtes Wasser.

## ANWENDUNGSGEBIETE

- Hygienische und chirurgische Händedesinfektion
- Hautdesinfektion von unverletzter Haut
- Zur Bekämpfung von Bakterien (inkl. TbB), Pilzen, behüllten und unbehüllten Viren, Rota-, Adeno- und Norovirus

## ART DER ANWENDUNG / DOSIERUNGSANLEITUNG

Äußerlich, unverdünnt anwenden!

### Chirurgische Hände-Desinfektion

Mind. 5 ml AHD 2000® in die Hände und auf die Unterarme geben und bis zur Trocknung einreiben unter besonderer Berücksichtigung der Fingerkuppen und Nagelfalz.  
Dauer: 1½ Minuten.

### Hygienische Hände-Desinfektion (auch im Falle von § 18 Infektionsschutzgesetz (IfSG))

Die Hände müssen während der gesamten Einwirkzeit durch das konzentrierte Präparat feucht gehalten werden (mindestens 3 ml – 30 Sekunden).

### Haut-Desinfektion

Die zu desinfizierende Hautfläche des Patienten vollständig mit AHD 2000® benetzen und mind. 10 Sekunden trocknen lassen, insbesondere vor Einsatz thermoelektrischer Geräte.

Wirksamkeit	Einwirkzeit (mind.)
Hygienische Händedesinfektion (EN 1500)	30 s
Chirurgische Händedesinfektion (EN 12791)	1,5 min
Hautdesinfektion (an talgdrüsenarmer Haut)	15 s
Vor Punktionen und Injektionen	15 s
Vor Punktionen von Gelenken, Körperhöhlen, Hohlorganen und operativen Eingriffen	1 min
Hautdesinfektion (an talgdrüsenreicher Haut) vor allen Eingriffen	1 min
Bakterizid (EN 13727) inkl. TbB (EN 14348)	30 s
Fungizid (EN 13624)	15 s
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) (gem. RKI-Empfehlung BG-Blatt 01/2004) (EN 14476)	30 s
Begrenzt viruzid PLUS (inkl. Rota-, Adeno-, Norovirus) (EN 14476)	30 s

## Kinder und Jugendliche

Für die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen aufgrund des Fehlens von Daten zur Sicherheit nicht empfohlen. Nur unter ärztlicher Kontrolle anwenden.

## Schwangerschaft und Stillzeit

Bei sachgemäßem Gebrauch kann AHD 2000® während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden.

## GEGENANZEIGEN

Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe.

## WECHSELWIRKUNGEN

Keine bekannt.

## NEBENWIRKUNGEN

Selten ( $\geq 1/10.000$ ,  $< 1/1.000$ ): Es kann zu für alkoholische Hände- und Hautdesinfektionsmitteln typischen Nebenwirkungen wie Hautirritationen (Rötung, Brennen, Austrocknen der Haut) kommen.

Sehr selten ( $< 1/10.000$ ): Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

### Meldung von Nebenwirkungen:

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen nach der Zulassung ist von großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzuzeigen.

## WARN- UND LAGERHINWEISE

- AHD 2000® ist augen- und schleimhautreizend. Es sollte nicht in der Nähe der Augen, auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten angewendet werden. Bei unbeabsichtigtem Kontakt mit Augen oder Schleimhäuten wird empfohlen, sofort mit viel Wasser zu spülen (im Falle der Augen auch unter Augenlidern). Bei anhaltender Reizung muss ein Arzt aufgesucht werden.
- AHD 2000® ist nur äußerlich anzuwenden. Bei versehentlicher Einnahme ist unverzüglich ärztlicher Rat einzuholen.
- Für den Fall, dass bei häufiger Anwendung von AHD 2000® kleinere Hautirritationen (z. B. trockene Hände) auftreten, sollte die Hautpflege intensiviert werden.
- Vor Anwendung elektrischer Geräte müssen Hände und Patientenhaut trocken sein. Vorsicht ist geboten bei der Anwendung von AHD 2000® bei alkoholempfindlichen Oberflächen.
- AHD 2000® ist leicht entzündlich (Flammpunkt nach DIN 51 755: 19 °C). Nicht in offene Flamme sprühen!
- Arzneimittel nicht über 25 °C, nicht in der Nähe von Zündquellen und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden!

## EIGENSCHAFTEN

- umfassendes Wirkungsspektrum
- Ethanol ist wirksam gegen gram-negative und gram-positive Bakterien, einschließlich Mykobakterien, Hefen und Viren. Ethanol ist auch wirksam gegen antibiotikaresistente Bakterienstämme (z. B. MRSA).
- zuverlässige Wirkung in Gegenwart von Eiweiß, Serum und Blut
- gut hautverträglich, auch bei häufiger Anwendung

Folgende aufeinander abgestimmte Präparate sollten vor der chirurgischen Hände-Desinfektion zum Reinigen verwendet werden: **ACO®-san sensitive**, **Wasa®2000** oder **Wasa®-Soft**.

Nach Arbeitschluss sollten folgende Produkte verwendet werden: zur Hautpflege und -regeneration: **Luphenil®**, zum Hautschutz: **ACO®-care sensitive**, **Majola®-H5-Creme**.

## Anwendungsplan Chirurgische Hände-Desinfektion

<b>Chirurgische Hände-Desinfektion:</b>	Präparat	Art der Anwendung
<b>Vor der Operation</b> Vorreinigung (nicht notwendig bei sichtbar sauberen Händen)	<b>ACO®-san sensitive</b> bzw <b>Wasa® 2000</b>	Hände und Unterarme anfeuchten, mit ACO®-san sensitive bzw Wasa® 2000 waschen, gut abspülen und abtrocknen.
Desinfektion	<b>AHD 2000®</b>	Mind. 5 ml AHD 2000® in die Hände und auf die Unterarme geben und bis zur Trocknung einreiben unter besonderer Berücksichtigung der Fingerkuppen und Nagelfalz. Dauer: 1 ½ Minuten.
<b>Nach der Operation</b> Nachwaschung	<b>ACO®-san sensitive</b> bzw <b>Wasa® 2000</b>	Hände und Unterarme anfeuchten, mit ACO®-san sensitive bzw. Wasa® 2000 waschen, gut abspülen und abtrocknen.
<b>Hauptpflege und -regeneration- Hände-/ Hautschutz</b>	<b>Luphenil®</b>  <b>ACO®-care sensitive Majola®-H5-Creme</b>	Dünn auf die Haut/Hände auftragen und gut verreiben.

### PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

- Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen („Sterilbank“) erfolgen.
- Haltbarkeit: 36 Monate  
 Auch nach Anbruch nur bis zum Verfallsdatum verwenden. Bei Einsatz des Präparates in offenen Wandspendersystemen: 8 Monate verwendbar, jedoch nicht über das Verfallsdatum hinaus verwenden.  
 Stets Kennzeichnung des Behältnisses beachten!

### BESONDERE HINWEISE

Arzneimittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Gebrauchsinformation lesen.

Zertifiziert und in den einschlägigen Listen aufgeführt.

**VERSANDEINHEIT / PACKUNG**

	<b>Art.-Nr.</b>
20 x 125 ml-Flasche	5576
15 x 250 ml-Flasche mit Sprüher	5602
12 x 500 ml-Flasche	8505
6 x 1-Liter-Flasche	5584
2 x 5 Liter-Kanister	9875

**Zubehör**

Lydos F-Wandspender für 500 ml-Flasche	5810
Lydos 1000-Wandspender für 1000 ml-Flasche	5763

Haben Sie spezielle Fragen? Rufen Sie uns an!  
Wir rufen sofort zurück.  
**030 77992-0**



**Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH**  
Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin  
Telefon 030 77992-0, Telefax 030 77992-269  
[www.lysoform.de](http://www.lysoform.de), e-mail: [kontakt@lysoform.de](mailto:kontakt@lysoform.de)