

Desinfektionsplan

Mexikanisches
Influenzavirus
(Schweinevirus)

Patientenzimmer

Stand: Mai 2009

Was	Wann	Wie	Womit	Wer
Hände- desinfektion	vor und nach Patienten-/ Bewohnerkontakt, vor Verlassen des Zimmers und nach Toilettenbesuch	30 Sek. die Hände mit der unverdünnten Lösung feucht halten	AHD 2000 Hospisept	Alle: Aerzte Pflegepersonal Besucher Mitbewohner Reinigungs- kräfte
Händewaschung	bei Bedarf, nach der Händedesin- fektion und bei sichtbarer Verschmutzung	Entnahme des Konzentrats aus Wandspender, gründlich abspülen, mit Einmal-Hand- tüchern abtrocknen	WASA-Soft	Alle: Aerzte Pflegepersonal Besucher Mitbewohner Reinigungs- Kräfte
Instrumente Manuell	sofort nach Gebrauch Kontamination	in die Anwendungs- lösung einlegen	Almyrol 1 % - 5 Min. Aldosan 2000 2 % - 15 Min.	Arzt Pflegepersonal
Patienten- / Be- wohnerwäsche Bettwäsche Handtücher	bei Verschmutzung und auf Anweisung	verschmutzte Wäsche im Patienten-/Bewohner zimmer in den Wäsche- sammeler entsorgen und im geschlossenen Wäschesack dem Wasch- verfahren zuführen	thermisch	Pflegepersonal Wäscherei- personal
Kontaktflächen: Handläufe Türgriffe Schalter Oberflächen: Möbiliar (sofern desinfizierbar) Fussboden Waschplätze: Armaturen Waschbecken	1 x täglich und bei Bedarf	desinfizierend reinigen	Aldosan 2000 Lysoformin spezial Lysoformin- plus Schaum	Pflegepersonal

Desinfektionsplan

Mexikanisches
Influenzavirus
(Schweinevirus)

Patientenzimmer

Stand: Mai 2009

Was	Wann	Wie	Womit	Wer
Sanitärbereich, Toilette: Dusche Haltegriffe Toilettenbrille Toilettenbürste-/ halterung Toilettenstühle	mehrmals täglich nach jeder Benutzung	Desinfizierend abwischen	Fugaten Aerodesin 2000 Hospisept-Tuch	Reinigungs- und Pflegepersonal
Mundschutz *	Bei Betreten des Zimmers anlegen und bei Verlassen des Zimmers entsorgen	Im Patienten-/ Bewohnerzimmer in den Müllbehälter entsorgen		Alle: Aerzte Pflegepersonal Besucher Mitbewohner Reinigungskräfte

* **Notwendig vor allem bei Gefahr von Aerosolbildung mit virushaltigem Material**

H I N W E I S E

- Beim Umgang mit Flächen- und Instrumentendesinfektionsmitteln empfehlen wir geeignete Schutzhandschuhe zu tragen.
- Die Desinfektionsmittellösungen sind mit kaltem Wasser anzusetzen und täglich zu wechseln
- Besucher sind durch Fachpersonal entsprechend einzuweisen
- Besondere Beachtung gilt der Nutzung eines Mundschutzes, weil vor allem Ansteckungsgefahr durch Aerosolbildung mit virushaltigem Material besteht