

# Poly-Alcohol Haut ... Antisepticum (farblos/gefärbt)

**LYSOFORM**  
Seit ▪ Since ▪ Depuis 1900

Gebrauchsfertiges, alkoholisches Hautantisepticum zur präoperativen Behandlung der Haut, vor Inzisionen, Punktionen und Injektionen

© Lysoform 2023-09-19/01 DE

## GEBRAUCHSINFORMATION

Bitte sorgfältig lesen!

## POLY-ALCOHOL HAUT ... FARBLOS/GEFÄRBT ANTISEPTICUM

### Gebrauchsfertig

70 ml 2-Propanol/100 ml Lösung zur Anwendung auf der Haut

## STOFF- ODER INDIKATIONSGRUPPE, WIRKUNGSWEISE:

Gebrauchsfertiges, alkoholisches Hautantisepticum. Bakterizid (inkl. TB), fungizid und begrenzt viruzid gemäß RKI Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 3/2017. VAH-zertifiziert.

## ANWENDUNGSGEBIETE:

- zur Hautdesinfektion vor Operationen, Inzisionen, Punktionen und Injektionen sowie zur hygienischen Händedesinfektion
- Das farblose Produkt kann bei Bedarf auch zur chirurgischen Händedesinfektion verwendet werden.

Poly-Alcohol Haut-Antisepticum ist je nach Bedarf und Anwendungsbereich als farblose und gefärbte Lösung erhältlich.

## GEGENANZEIGEN:

Dieses Arzneimittel darf nicht angewendet werden, wenn Sie allergisch gegen 2-Propanol oder einen der sonstigen Bestandteile sind. Nicht auf der Schleimhaut oder im Augenbereich anwenden.

Prüfung	Konzentration	Einwirkzeit
<b>VAH – Hautdesinfektion</b>		
talgdrüsenarme Haut:		
vor Injektionen und Punktionen	unverdünnt	15 s
vor Punktionen von Gelenken, Körperhöhlen, Hohlororganen sowie operativen Eingriffen	unverdünnt	30 s
talgdrüsenreiche Haut:		
vor Punktionen und Operationen	unverdünnt	3,0 min
<b>VAH – Händedesinfektion (farblos)</b>		
VAH – hygienische Händedesinfektion DGHM / EN 1500	unverdünnt	30 s
VAH – chirurgische Händedesinfektion DGHM / EN 12791	unverdünnt	1,5 min
<b>DVV / RKI-Leitlinie – viruzide Wirkung</b>		
begrenzt viruzid* (inkl. HIV / HBV / HCV)	unverdünnt	30 s
Vacciniavirus	unverdünnt	30 s
BVDV (Bovine Viral Diarrhea Virus)	unverdünnt	30 s
<b>RKI-Listung</b>		
Wirkungsbereich A	unverdünnt	30 s

\* gemäß DVV/RKI-Stellungnahme, Bundesgesundheitsblatt 3/2017, nicht wirksam gegen Noroviren

## VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE:

Kontakt mit den Augen sollte vermieden werden. Bei versehentlichen Spritzern ins Auge sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren. Alkoholhaltig, brennbar. Vor Anwendung elektrischer Geräte Haut gut trocknen lassen.

Bei Säuglingen darf dieses Arzneimittel nur unter ärztlicher Aufsicht angewendet werden.

## WECHSELWIRKUNGEN MIT ANDEREN

### ARZNEIMITTELN:

Keine bekannt.

## SCHWANGERSCHAFT UND STILLZEIT:

Bei sachgemäßem Gebrauch kann dieses Arzneimittel während Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden.

## LISTUNG:

- VAH-Liste
- ÖGHMP-Liste
- RKI-Liste Wirkungsbereich A (farblos)



**Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH**  
D-12247 Berlin, Kaiser-Wilhelm-Str. 133  
Telefon: +49 30 77992-0, Fax: +49 30 77992-219  
Mail: kontakt@lysoform.de, www.lysoform.de

MADE IN GERMANY

# Poly-Alcohol Haut ... Antisepticum (gefärbt/ungefärbt)

SEITE 2

## DOSIERUNGSANLEITUNG, ART UND DAUER DER ANWENDUNG:

### Zur Hautdesinfektion:

Unverdünnt auf die Haut auftragen.

Talgdrüsenarme Haut

- Vor Injektionen und Punktionen 15 Sekunden feucht halten.
- Vor Punktionen von Gelenken, Körperhöhlen, Hohlorganen sowie operativen Eingriffen mindestens 60 Sekunden feucht halten.

Talgdrüsenreiche Haut

- Vor Punktionen und Operationen mindestens 3 Minuten feucht halten.

### Zur hygienischen Händedesinfektion

Unverdünnt in die Hände einreiben, diese während 30 Sekunden feucht halten.

### Zur chirurgischen Händedesinfektion

(farblos): Unverdünnt in die Hände und auf die Unterarme einreiben, diese während 1,5 Minuten feucht halten.

Eine begrenzt viruzide Wirkung wird in-vitro nach 30 Sekunden erzielt.

## NEBENWIRKUNGEN:

Mögliche bekannte Nebenwirkungen sind Hautirritation oder Hauttrockenheit sowie kontaktallergische Reaktionen.

Orange S kann Überempfindlichkeitsreaktionen hervorrufen

## MELDUNG VON NEBENWIRKUNGEN:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Produktinformation angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-

Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## ANGABEN ZUR DAUER DER HALTBARKEIT UND AUFBEWAHRUNG:

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats. Nach Anbruch 6 Monate haltbar.

**Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.**

## ZUSAMMENSETZUNG:

100 ml Lösung enthalten:

*Wirkstoff:* 2-Propanol 70 ml.

*Sonstige Bestandteile:* Gereinigtes Wasser, Butan-1,3-diol, Gelborange S (gefärbt), Chinolingelb (gefärbt)

## DARREICHUNGSFORM UND INHALT:

Lösung zur Anwendung auf der Haut. Klare, farblose Lösung.

200 ml, 250 ml, 400 ml, 1000 ml, 5000 ml.

## PHARMAZEUTISCHER UNTERNEHMER:

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH

Kaiser-Wilhelm-Straße 133

12247 Berlin

Tel.: +49 30 77992-0

Telefax +49 30 77992219

## ZULASSUNGSNUMMER

Zugelassenes Arzneimittel gem. AMG

Zul.-Nr. farblos: 2931.00.00

Zul.-Nr. gefärbt: 2930.00.00

## STAND DER INFORMATIONEN:

April 2023

## VERSANDEINHEIT / PACKUNG

	FARBLOS	GEFÄRBT
30 x 200 ml-Flasche	71047	71050
10 x 1-Liter-Flasche	71048	71051
2 x 5-Liter-Kanister	71049	

## PHARMAZENTRALNUMMERN

farblos

200 ml:

PZN 05905148

1 L:

PZN 05905131

gefärbt

200 ml:

PZN 05905160

1 L:

PZN 05905154

© Lysoform 2023-09-19/01 DE



**Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH**  
D-12247 Berlin, Kaiser-Wilhelm-Str. 133  
Telefon: +49 30 77992-0, Fax: +49 30 77992-219  
Mail: [kontakt@lysoform.de](mailto:kontakt@lysoform.de), [www.lysoform.de](http://www.lysoform.de)

MADE IN GERMANY